

SITONA DE LAS LEGUMINOSAS (*Sitona* sp.)



OBSERVATORIO
de plagas y enfermedades
agrícolas de Castilla y León



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
AGRARIO



**Junta de
Castilla y León**

AGENTE CAUSAL

Coleóptero de la familia *Curculionidae*.

Adulto:

- ☑ El adulto es un gorgojo pequeño de 4-6 mm de longitud.
- ☑ Coloración gris o parda con vetas mas claras. Cabeza alargada y pico corto. Ojos grandes.
- ☑ Las antenas, las tibias y los tarsos a menudo son rojizos.
- ☑ Se distingue de otras especies porque las rayas se extienden por el pronoto (placa dorsal del primer segmento del tórax o "protórax")
- ☑ Muerden los bordes de las hojas jóvenes dejando unas muescas semicirculares.

Larva:

- ☑ La larva mide entre 5-6 mm de longitud.
- ☑ Cuerpo arqueado, blanco y carnoso, carece de patas. Cabeza de color marrón amarillento.
- ☑ Viven bajo tierra, son difíciles de detectar.
- ☑ Periodo larvario de 3-4 semanas, dependiendo de la temperatura y la humedad.
- ☑ Se alimentan de raicillas y de los nódulos de *Rhizobium* de la planta huésped.

Pupa:

- ☑ La pupa es libre y se desarrolla en el suelo dentro de una celda a 10-15 cm de profundidad.

Huevos:

- ☑ Color blanco amarillento en la puesta, con el tiempo se melanizan.



Adulto




Larva atacando un nódulo




Pupa

CICLO, SÍNTOMAS Y DAÑOS




- ☑ Se alimenta principalmente de leguminosas de grano (habas, judías, guisantes, lentejas, vezas) como forrajeras (alfalfa, trébol).
- ☑ Una generación al año. Los adultos aparecen cuando se alcanzan 12-14°C de media. Presentes casi todo el año, hasta que bajan las temperaturas y entran en diapausa hasta la primavera siguiente. Se alimentan de las hojas, provocando un aspecto festoneado muy característico en el borde de las hojas.
- ☑ Depositán los huevos en las hojas o bajo la planta, con puestas escalonadas desde abril a julio (media diaria de 60 huevos/hembra, total de 500-3000). En tiempo cálido y seco se malogra el 80%. La larva migra bajo tierra y devora los nódulos fijadores de nitrógeno de la raíz, debilitando la planta.
- ☑ Los daños no suelen ser importantes salvo en ataques tempranos sobre plantaciones muy jóvenes o poblaciones muy elevadas.



Muecas características en guisante y veza

LUCHA INTEGRADA

Calendario de vigilancia:



Medidas preventivas:

- ☒ Arado de la parcela tras cosecha, enterrando los restos de plantas para limitar las infestaciones posteriores.
- ☒ Rotación con cultivos no huésped.
- ☒ En el caso de la alfalfa, adelantar los cortes.

Umbral de tratamiento para lucha química:

- ☒ Umbral de riesgo: Promedio de 10 huevos/planta o 3 adultos en un manguero de 180°. Muy difícil de apreciar. Las mordeduras de las hojas pueden dar idea del tamaño de la población.
- ☒ Los daños finales son importantes sólo ante ataques importantes en estadios tempranos del cultivo: tratar en primavera, entre la nascencia y el estado de 4-5 hojas, preferible antes de que comiencen las puestas, si se ven importantes mordeduras en los bordes.
- ☒ En el caso de la alfalfa, espaciar el posible tratamiento con el corte.
- ☒ Utilizar únicamente productos autorizados e inscritos en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. Consultar el Registro antes de cualquier aplicación:

<http://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp>

PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA PLAGAS AGRÍCOLAS EN CASTILLA Y LEÓN (Acuerdo 53/2009, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León)

El Plan Director constituye una estrategia de apoyo directo al agricultor por parte de la Junta de Castilla y León, acorde con un modelo sostenible de la producción y del medio ambiente. Con esta ficha se persigue contribuir a un mayor conocimiento de las plagas y enfermedades y de las posibles medidas a considerar dentro de un marco de lucha integrada.

PARA CUALQUIER DUDA O NECESIDAD DE ASESORÍA, Ponerse en contacto con:

Secciones de Sanidad y Producción Vegetal de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería,
Secciones Agrarias Comarcales, Unidades de Desarrollo Agrario y/o Área de Plagas del ITACyL.